

	Asymptomatische patiënten zonder risicofactoren voor vroeggeboorte	Asymptomatische patiënten zonder vroeggeboorte i.a. maar wel verhoogd risico op vroeggeboorte		Asymptomatische patiënten met vroeggeboorte i.a. <34 weken	Asymptomatische patiënten met vroeggeboorte 34-37 weken i.a.	Meerling zwangerschappen
Cervixlengte screening	n.v.t.	Indien uterusanomalie * 13, 16, 19, 23 weken	Indien anamnese van sectio bij VO conus/lis 13-19 weken	13, 16, 19, 23 weken	19 en 23 weken	t.t.v. TTSEO of GUO
progesteron	Bespreek indien bij toeval gemeten CL <25mm	Bespreek indien CL <25mm		Optie bij iedereen Advies indien CL < 25 mm	Bespreek indien CL <25mm	Indien CL < 25mm, counseling over de twin cerclage studie
Cerclage	Bespreek indien CL<10mm	Optie indien CL <25mm Advies indien < 15 mm		Optie indien CL <25mm Advies indien < 15 mm	Optie indien CL <25mm Advies indien < 15 mm	

* met uitzondering van een uterus arcuatus

De afkapwaardes CL metingen betreffen metingen < 24 weken. Vanaf 24 weken wordt verwezen naar het zorgpad dreigende vroeggeboorte.

De meerwaarde van progesteron of een cerclage betreft een verschillende mate van zekerheid van het voordeel met een bijbehorende terminologie. Uiteraard vergen alle opties counseling en kan er vanaf gezien worden.

Optioneel: het voordeel is minder duidelijk maar niet helemaal uit te sluiten.

Bespreek: het voordeel lijkt groter dan het nadeel.

Advies: het voordeel is bewezen groter dan het nadeel.